

Abstract 214

TRATTAMENTO DELLA CORIORETINOPATIA SIEROSA CENTRALE CON INDOMETACINA PO E COLLIRIO.

Oral

Marolda P.*, Fiormonte F.

Università Campus Bio-Medico ~ Roma ~ Italy

Purpose:

Descriviamo il follow-up di due pazienti affetti da corioretinopatia sierosa centrale ai quali è stata sottoposta una terapia di seconda linea con indometacina sistemica e collirio.

Methods:

Due pazienti, femmina di 36 anni e maschio di 39, si presentano presso il nostro centro con una storia di CRSC cronica (6 e 9 mesi) non risolutasi nè dopo un periodo di osservazione nè dopo vari trattamenti presso altri centri con acetazolamide, cortisonici ed alcuni FANS. La diagnosi viene confermata attraverso l'utilizzo di SD-OCT; nessuna altra complicanza oftalmologica viene evidenziata.

Viene iniziato il trattamento con indometacina po 25 mg 3 volte/die e indometacina collirio 5 mg/ml 4 volte/die.

Results:

A 3 mesi dall'inizio del nuovo trattamento entrambi i casi si sono favorevolmente risolti come evidenziato da scansioni SD-OCT.

Conclusions:

L'associazione di Indometacina assunto sia per via sistemica che locale potrebbe, se supportato da ulteriori evidenze scientifiche, rappresentare una valida opzione terapeutica sia come prima linea che nei casi di CRSC che non vanno incontro nè a spontanea risoluzione nè ad altri trattamenti.